

**در صورت بروز هر یک از علائم زیر به پزشک**

**مراجعه کنید:**

- \* سردرد شدید، اختلال دید یا دوبینی
- \* اختلال تکلم
- \* گیجی و منگی و کاهش سطح هوشیاری
- \* بروز تشنجه، سابقه سکته مغزی
- \* درد قفسه سینه
- \* رنگ پریدگی شدید و تعزیق سرد، استفراغ های مکرر و شدید.
- \* سابقه فشار خون و دیابت
- \* درد شدید گوش یا خروج ترشحات چرکی از گوش

**منبع:**

پرستاری داخلی - جراحی برونر و سوداث

**بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر**

**سرگیجه**



**واحد آموزش به بیمار**

**AH/HE ۴**

**بهار ۱۴۰۱**

**نشانی :**

خمینی شهر - خیابان بوعلی - بیمارستان شهید اشرفی طبقه  
اول - واحد آموزش به بیمار

شماره تلفن : ۰۳۱-۳۳۶۲۵۰۸۱



## پس از ترخیص تا زمان بھبودی به نکات زیر توجه کنید:

- ۱- حملات سر گیجه شما ممکن است تا چند ماه (۳-) عادامه یافته و روزانه چندین نوبت تکرار شود.
- ۲- سر گیجه معمولاً "با تغییر حالت بدن و یا خوابیدن به یک سمت مشخص تشدید می شود بنابراین از خوابیدن به این سه ۳- هنگام خواب سر خود را کاملاً "بالا قرار دهید.
- ۴- از مصرف خودسرانه و افراطی داروهای خواب آور و آرام بخش پرهیز کنید.
- ۵- از هرگونه تغییر حالت ناگهانی ( مثلًا "از حالت نشسته به ایستاده ) پرهیز کنید.
- ۶- هنگام برخاستن از رخت خواب ابتدا برای چند دقیقه بنشینید سپس برخیزید.
- ۷- از خم کردن ناگهانی یا سریع سر و هم چنین پایین نگه داشتن سر برای مدت طولانی ( مثلًا برای تمیز کردن زمین پرهیز کنید.
- ۸- هنگامی که در منزل تنها هستید از رفتن به حمام خودداری کنید.
- ۹- هنگام تنها یابی در منزل همواره گوشی تلفن یا تلفن همراه خود را در دسترس و نزدیک خود قرار دهید.
- ۱۰- از مصرف غذاهای شور خودداری کنید.
- ۱۱- از حضور طولانی مدت ( حرکات مداوم ) در اتومبیل یا اتوبوس خودداری کنید.
- ۱۲- هنگام حضور در اتومبیل به هیچ وجه مطالعه نکنید.
- ۱۳- استراحت کافی و خواب منظم داشته باشید.
- ۱۴- مایعات کافی بنوشید تا دچار کم آبی نشوید

سر گیجه غالب به شکل حمله ای رخ می دهد اما طول مدت حملات و میزان تکرار یا مقارب آن ها می تواند بسیار متفاوت باشد. به شکلی که یک حمله ممکن است از چند ثانیه تا چندین ساعت یا حتی روز طول بکشد. احساس سر گیجه ممکن است با حرکات سر، تغییر وضعیت بدن (ایستادن یا خوابیدن، حرکت کردن و راه رفتن)، سرفه و عطسه، شدید شود.

### علائم سر گیجه:

- تهوع و استفراغ
- سردرد خفیف
- تاری دید
- تعریق
- تپش قلب
- حساسیت به نور یا صدا
- صدای سوت یا زنگ در گوش



سر گیجه یک واژه کلی و عمومی است که اغلب به کلیه حالات ناخوشایندی که فرد با ایجاد آنها احساس عدم تعادل و امکان سقوط و زمین خوردن می کند، گفته می شود . شامل مجموعه وضعیت هایی مانند: سیاهی چشم، سرخوردن و خالی یا گود شدن زیر پا می شود. اما سر گیجه حقیقی فقط شامل احساس چرخیدن خود فرد یا چرخش محیط اطراف می باشد که ناشی از

بروز نوعی اختلال در سیستم عصبی یا گوارش داخلی است که در این میان علل مربوط به گوش داخلی بسیار شایع است.

### علل سر گیجه:

- ۱- کم آبی بدن ناشی از استفراغ، تب و سایر علل استرس، اضطراب، فشارهای عصبی و روانی
- ۲- افسردگی
- ۳- بی نظمی ضربات قلب، حساسیت به مواد مختلف
- ۴- بدخی مسمومیت ها
- ۵- بیماری های ویروسی مانند سرماخوردگی یا آنفولانزا
- ۶- تنفس های سریع و کوتاه
- ۷- مصرف سیگار، الکل و تنباق
- ۸- کم خونی
- ۹- خونریزی
- ۱۰- کاهش لحظه ای فشار خون
- ۱۱- افت قند خون
- ۱۲- بارداری
- ۱۳- بعضی از داروها مثل داروهای ادرار آور، آرام بخش و داروهای روانپردازشکی